

## 乙酸激酶（acetate kinase, ACK）试剂盒说明书

货号：G0865F 分光法 48 样

### 一、产品简介：

乙酸激酶（ACK, EC 2.7.2.1）是与乙酸代谢相关的关键酶，催化乙酸和 ATP 生成乙酰磷酸和 ADP，最终进入三羧酸循环进行乙酸代谢。

ACK 催化乙酸钠和 ATP 生成乙酰磷酸和 ADP，丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶进一步依次催化 NADH 氧化生成 NAD<sup>+</sup>，在 340nm 下测定 NADH 下降速率，即可反映 ACK 活性大小。

### 二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	粉剂 mg×1 瓶	4℃ 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，再加 8.4mL 的蒸馏水溶解
试剂二	粉剂 mg×4 支	-20℃ 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，每支加 1.1mL 的蒸馏水溶解，用不完的试剂分装后-20℃ 保存，禁止反复冻融，三天内用完。
试剂三	粉剂 mg×1 支	-20℃ 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，再加 4.2mL 的蒸馏水溶解备用。
试剂四	粉剂 mg×1 支	-20℃ 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，再加 4.2mL 的蒸馏水溶解备用。

### 三、所需的仪器和用品：

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿（光径 1cm）、低温台式离心机、恒温培养箱、移液器、研钵、冰和蒸馏水

### 四、乙酸激酶（ACK）活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

#### 1、样本制备：

##### ① 组织样本：

称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm，4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

**【注】：**若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例进行提取。

##### ② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液；冰浴超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm，4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

**【注】：**若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（10<sup>4</sup> 个）：提取液（mL）为 1:1000~5000 比例进行提取。

#### 2、上机检测：

① 紫外分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 340nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温（25℃）。

③ 依次在 1mL 石英比色皿中加入：

试剂名称（ $\mu$ L）	测定管
提取液	320
试剂一	160

试剂二	80
试剂三	80
试剂四	80
混匀, 37°C下, 孵育 5min 后。	
样本	60
混匀, 10s 时于 340nm 处读取吸光值 A1, 10min 后读取吸光值 A2, $\Delta A=A1-A2$ 。	

- 【注】** 1. 若  $\Delta A$  的值在零附近, 可以适当延长反应时间到 20min 或更长读取 A2, 改变后的反应时间需代入计算公式重新计算。或适当加大样本量 V1 (如增至 100 $\mu$ L, 则提取液相应减少), 则改变后的加样体积 V1 和反应时间 T 需代入计算公式重新计算。
2. 若起始值 A1 太大如超过 2 (如颜色较深的植物叶片, 一般色素较高, 则起始值相对会偏高), 可以适当减少样本加样量 V1, 则改变后的加样体积 V1 需代入计算公式重新计算。或向待测样本中加少许活性炭混匀静置 5min 后 12000rpm, 4°C 离心 10min, 上清液用于检测;
3. 若  $\Delta A$  大于 0.6, 可减少反应时间 (如 5min), 则改变后的反应时间 T 代入计算公式重新计算。
4. 若下降趋势不稳定, 可以每隔 10S 读取一次吸光值, 选取一段线性下降的时间段来参与计算, 相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

## 五、结果计算:

### 1、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$ACK \text{ (nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (Cpr \times V1 \div V) \div T = 209 \times \Delta A \div Cpr$$

### 2、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$ACK \text{ (nmol/min/g 鲜重)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 209 \times \Delta A \div W$$

### 3、按细菌/细胞密度计算:

酶活定义: 每 1 万个细菌/细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$ACK \text{ (nmol/min / } 10^4 \text{ cell)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.42 \times \Delta A$$

$\epsilon$ ---NADH 摩尔消光系数, 6.22 $\times 10^3$  L / mol / cm;      d---光径, 1cm;

V---加入提取液体积, 1 mL;

V1---加入样本体积, 0.06 mL;

V2---反应体系总体积, 7.8 $\times 10^{-4}$  L;

T---反应时间, 10 min;

500---细菌或细胞总数, 500 万。

W---样本质量, g;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。